



Descripción

Alimento para propósitos médicos específicos.

Fórmula en polvo de alto contenido energético, con bajos niveles de proteínas, potasio, fósforo, calcio, cloruro y vitamina A, elaborada con proteínas de suero de leche, aminoácidos, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos, ácido araquidónico (ARA) y ácido docosahexaenoico (DHA).

Indicaciones

Está indicado para el abordaje nutricional de la enfermedad renal desde el nacimiento hasta los 10 años.

Dosis y administración

La dosis y la forma de administración deben ser establecidas por el médico o nutricionista, en función de la edad, el peso y la afección del paciente. Se puede combinar con leche materna, fórmula infantil, fórmula enteral pediátrica estándar o una dieta mixta.

Instrucciones de preparación

Para lactantes alimentados con mamadera

La dilución estándar al 20% se prepara agregando 1 cucharada al ras de Renastart (7 g) a 30 ml de agua.

Siga cuidadosamente las instrucciones de preparación. Una preparación incorrecta puede ser perjudicial para el niño.



Lávese bien las manos.



Esterilice la mamadera y los accesorios de acuerdo con las instrucciones del fabricante.



Hierva agua potable y déjela enfriar durante no más de 30 minutos, para asegurarse de que se mantenga a una temperatura mínima de 70 °C. No utilice agua enfriada artificialmente ni agua hervida en repetidas ocasiones.



Mida la cantidad de agua necesaria y colóquela en la mamadera.



Con la cuchara medidora provista, agregue la cantidad indicada de Renastart al agua, nivelando cada cucharada con el dorso de un cuchillo limpio y seco. No compacte el polvo en la cuchara medidora.



Coloque la tetina y la tapa esterilizadas en la mamadera, y agite bien hasta que el polvo se disuelva por completo. Deje enfriar hasta alcanzar la temperatura de consumo (aprox. 37 °C). Antes de alimentar al niño, controle siempre la temperatura, dejando caer unas gotas en la cara interna de la muñeca: la preparación debe sentirse tibia, no caliente.



Renastart ya está listo para consumir.

Debe desechar cualquier sobrante de la fórmula que quede en la mamadera después de más de una hora. No recaliente Renastart una vez iniciado el consumo.

Otras diluciones, alimentación por sonda y alimentación de niños mayores:

La preparación debe ser indicada por el médico o nutricionista. Renastart suele prepararse con agua, siguiendo las indicaciones del médico o nutricionista. Las preparaciones que se hagan con anticipación debe conservarse refrigeradas y utilizarse dentro de las 24 horas.

Información importante sobre la alimentación

No caliente Renastart en microondas, ya que el calentamiento puede ser irregular y provocar quemaduras.

No hierva Renastart.

Los lactantes y niños pequeños deben estar siempre supervisados durante la alimentación. Se recomienda una higiene dental regular.

AVISO IMPORTANTE

Consumir bajo supervisión médica.

No apto para usar como única fuente de alimentación.

Apto desde el nacimiento hasta los 10 años.

Se requiere un control periódico del estado nutricional y de los niveles de electrolitos.

Información nutricional - Porción: (100 mL en Dilución 20%)

		100 mL dilución 20%	Por 100 g		100 mL dilución 20%	Por 100 g
Valor energético	kcal	100	496	Vitaminas		
Carbohidratos de los cuales:	g	12,6	62,5	Vitamina A	µg	26
Azúcares totales	g	1,3	6,5	Ácido Fólico	µg	16
Azúcares añadidos	g	1,24	6,2	Vitamina K	µg	6
Proteínas	g	1,5	7,5	Biotina	µg	4,4
Grasas totales de las cuales:	g	4,8	24	Vitamina D	µg	2,4
Grasas saturadas	g	1,2	6	Molibdeno	µg	1,6
Grasas trans	g	0	0	Vitamina B12	µg	0,2
Grasas monoinsaturadas	g	2,5	12,5	Minerales		
Grasas poliinsaturadas	g	0,9	4,5	Calcio	mg	24
Ácido linoleico (LA)	mg	746	3700	Potasio	mg	22
Ácido alfa linoleico (ALA)	mg	60	300	Fósforo	mg	19
Ácido decosahexanoico (DHA)	mg	23	115	Magnesio	mg	8,1
Ácido araquidónico (ARA)	mg	40	200	Hierro	mg	1
Coolesterol	g	0	0	Zinc	mg	0,89
Fibra alimentaria	g	0	0	Manganeso	mg	0,02
Sodio	mg	48	240	Cobre	µg	80
Vitaminas				Yodo	µg	19
Colina	mg	32,3	160	Selenio	µg	3,8
Vitamina C	mg	15	75	Cromo	µg	1,9
Vitamina E	mg	1,1	5,5			
Niacina	mg	0,83	4,1			
Ácido patotenico	mg	0,5	2,5			
Riboflavina	mg	0,1	0,5			
Vitamina B6	mg	0,1	0,5			

Osmolalidad: 230 mOsm/kg.
Densidad energética 1 kcal/mL.

Dedación de alérgenos

Contiene **leche** (proteína de la leche).

Almacenamiento

Sin abrir: guarde Renastart en un lugar fresco y seco.

Una vez abierto: utilice en el plazo de 3 semanas.

Cierre siempre el envase después usarlo.

Envasado en atmósfera protegida.

Vida útil

24 meses.

Presentación/Peso

Lata de 400 g, con cuchara
medidora incluida.

